

枫 杨 一 新 变 种

赵子恩

郑承金

(中国科学院武汉植物研究所) (宜昌地区林科所)

A NEW VARIETY OF *PTEROCARYA STENOPTERA* C. DC.

CHAO ZI-EN

ZHENG CHENG-JIN

(Wuhan Institute of Botany, Academia Sinica)

(Forestry Institute of Ichang Region)

枝江枫杨 新变种 图1

Pterocarya stenoptera C. DC. var. *zhijiangensis* Z. E. Chao et C. J. Zheng,
var. nov.

A typo differt foliis in ramo florifero saepe simplicibus integris aut 2—3-partitis
sectisve, eis in ramo repullulanti vulgo pin-
natis 3—5-foliolatis, angulo inter 2-alas nu-
cum 160° proximo, ceterum cum typo congr-
uens.

Hubei: Zhijiang, Zhouhu, alt. 150 m,
near the houses, 16, May 1980, T. Q. Xü 397
(Typus, in Herb. Wuhan Inst. Bot., Acad.
Sin.); same locality, C. J. Zheng without
number; same locality, K. R. Shi and F. Z.
Li, without number.

本变种与原种的区别, 在于它的花枝上的
叶通常为单叶, 无裂或具2—3深裂至全
裂; 萌芽条上的叶一般为羽状复叶, 小叶 3—
5; 果翅的夹角近 160° ; 其余同原种。

湖北: 枝江, 周湖, 海拔150米, 村庄旁
与枫杨混生, 1980年5月16日, 许天全 397
号(模式标本, 存于中国科学院武汉植物研究
所标本室); 同地, 郑承金无号; 同地, 施克荣、
李方柱无号。



图1 枝江枫杨 *Pterocarya stenoptera* C. DC.
var. *zhijiangensis* Z. E. Chao et C. J. Zheng